

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa oferowanej szczepionki	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego głównego antygeny powierzchniowego wirusa HBV (HbsAg) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych zawierająca 20 µg oczyszczonego białkowego antygeny Hbs, przeznaczona dla osób powyżej 15 roku życia, stosowana wg schematu szczepień: 0, 1, 6 miesięcy i 0,7, 21 dni, 12 miesięcy - schemat szybkiego uodpornienia (fiolki – 1 ml).		szt.	1000				
2.	Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego, głównego antygeny powierzchniowego wirusa HBV (HbsAg) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych zawierająca 10 µg czystego białka antygeny Hbs, 0,5 ml w dawce dla dzieci do 15 roku życia, stosowana wg schematu szczepień: 0, 1, 6 miesięcy i 0, 7, 21 dni- schemat szybkiego uodpornienia (ampułkostrzykawki – 0,5 ml).		szt.	50				
3.	Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi acelularna zawierająca : antytoksynę błoniczą, antytoksynę tężcową i trzy antygeny krztuścowe, anatoksynę krztuścową, hemaglutyninę włóknikową (FHA), pertaktynę (69 k DaOMP). Zarejestrowana możliwość równoczesnego podania ze szczepionką przeciw haemophilus influenzae typu B w jednej iniekcji. (ampułkostrzykawki – 0,5 ml)		szt.	30				

4.	Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio i haemophilus influenzae typ B zawierająca : toksoid błonicy, toksoid tężcowy , toksoid krztuścowy (PT) hemaglutyninę włóknikową (FHA), pertaktynę (69 kDa-OMP), wirus polio typ 1, inaktywowany wirus polio typ 2, inaktywowany wirus polio typ 3, oczyszczony polisacharyd otoczkowy Hib. Przeznaczona dla dzieci od 2 miesiąca życia w schemacie szczepienia pierwotnego – 3 dawki i dawka uzupełniająca w drugim roku życia (ampułko-strzykawki po 0,5 ml z zawiesiną DTPa –IPV + folka z liofilizatem Hib+ 2 igły).								1300	szt.
5.	Szczepionka skojarzona zawierająca toksoid błonicy, toksoid tężcowy, trzy oczyszczone antygeny krztuśca [toksoid krztuścowy (PT), hemaglutynina włóknikowa (FHA) i pertaktyna] adsorbowane na wodorotlenku glinu, trzy typy inaktywowanego wirusa polio (typ 1, 2, 3) oraz oczyszczony polisacharyd otoczkowy haemophilus influenzae typu B (Hib), związany kowalencyjnie z toksoidem tężcowym, antygen powierzchniowy hepatitis B (ilości 10 mikrogramów). Szczepionka zawierająca: 1 ampułkostrzykawka bez igły po 0,5 ml z zawiesiną (DTPa-IPV-HBV) + 1 folka z proszkiem (Hib) + 2 igły								600	szt.
6.	Adsorbowana szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, polio i haemophilus influenzae typu B zawierająca toksoid błonicy, toksoid tężcowy, toksoid krztuścowy (hemaglutynina włóknikowa) inaktywowane wirusy polio typ 1, 2 i 3 oraz oczyszczony polisacharyd otoczkowy haemophilus influenzae typu B w postaci ampułkostrzykawki z igłą (zawiesina DTPa -IPV + folka z liofilizatem HIB)								500	szt.
7.	Inaktywowana szczepionka przeciw grypie zawierająca fragmenty wirusa (split) produkowana wg norm WHO i Unii Europejskiej z udowodnionym działaniem uodporniającym w różnych grupach pacjentów i skutecznością kliniczną , potwierdzoną w polskich warunkach, wywołującą szybką odpowiedź immunologiczną; pozbawiona trimeresu jako środka konserwującego, zawierająca najmniej endotoksyn i białek jaja kurzego. Ampułkostrzykawka 0,5ml.								3000	szt.
8.	Szczepionka przeciw zakażeniom rotawirusowym, zawierająca ludzki rotawirus w postaci zawiesiny doustnej, stosowana w schemacie dwudawkowym – 1 dawka 1,5 ml.								300	szt.
9.	Szczepionka przeciw ospie wietrznej do stosowania od 9 miesiąca życia u dzieci i dorosłych, w schemacie dwudawkowym.								150	szt.

10.	Szczepionka przeciw zakażeniom pneumokokowym, skoniugowana, 13-walentna; zawiera sacharydy pneumokokowe; serotyp 6B skoniugowany białkiem nośnikiem ORM i adsorbowany na fosforanie glinu. Dawka 0,5 ml.	szt.	600			
11.	Szczepionka skoniugowana, czterowalentna, przeciwko meningokokom grup A,C,W 135 i Y, do stosowania powyżej 1 roku życia - ampułkostrzykawka 0,5 ml.	szt.	300			
12.	Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, inaktywowana dla dzieci, w dawce 0,25 ml – zawieszina do wstrzyknięć w ampułkostrzykawce.	szt.	30			
13.	Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla młodzieży i osób dorosłych, w dawce 0,5 ml – zawieszina do wstrzyknięć domięśniowych w ampułkostrzykawka.	szt.	10			
14.	Zawieszina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa antygeny krztuśca – toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włóknikową), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i <i>haemophilus</i> typ b (skoniugowana), adsorbowana. Ampuiko-strzykawka po 0,5 ml z zawiesziną, z 2 osobnymi igłami-pudełko po 1 szt.	szt.	500			

..... dnia

.....
 /podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
 upoważnionej do jego reprezentowania/